

## Rudiments de logique

### Quantificateurs et connecteurs logiques

#### Exercice 1

Enoncer pour chaque proposition  $\mathcal{P}$  qui suit, la proposition (*non*  $\mathcal{P}$ ).

- a) S'il pleut, je prends mon parapluie.
  - b) Chaque été, il pleut au moins une journée en Bretagne.
  - c) L'été dernier, il a plu tous les jours en Bretagne.
  - d) Dans la classe, il y a 16 filles et 18 garçon.
  - e) Dans la classe, il y a autant de filles que de garçons.
- 

#### Exercice 2

Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <math>\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 1</math> ;</li> <li>b) <math>\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 1</math> ;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>c) <math>\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 1</math> ;</li> <li>d) <math>\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y^2 = 1</math> ;</li> </ol> |
|--|--|
- 

#### Exercice 3

Traduire en français les énoncés mathématiques suivants puis écrire leur négation :

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <math>\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) \geq m</math> ;</li> <li>b) <math>\forall x \in I, \exists y \in \mathbb{R}, f(x) = y</math> ;</li> <li>c) <math>\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = y</math> ;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>d) <math>\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, u_n = u_{n_0}</math> ;</li> <li>e) <math>\exists T &gt; 0, \forall x \in \mathbb{R}, f(x + T) = f(x)</math> ;</li> <li>f) <math>\exists x_0 \in I, \forall x \in I, f(x) \leq f(x_0)</math>.</li> </ol> |
|--|---|
- 

#### Exercice 4

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ , et  $f$  une fonction définie sur  $I$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . Traduire mathématiquement les énoncés suivants puis écrire leur négation :

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la fonction <math>f</math> s'annule ;</li> <li>b) la fonction <math>f</math> est croissante ;</li> <li>c) la fonction <math>f</math> est décroissante ;</li> <li>d) la fonction <math>f</math> n'est pas monotone ;</li> <li>e) la fonction <math>f</math> est la fonction nulle ;</li> <li>f) la fonction <math>f</math> n'est pas constante ;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>g) la fonction <math>f</math> ne prend jamais deux fois la même valeur ;</li> <li>h) la fonction <math>f</math> présente un minimum ;</li> <li>i) la fonction <math>f</math> prend des valeurs arbitrairement grandes ;</li> <li>j) la fonction <math>f</math> ne peut s'annuler qu'une seule fois ;</li> <li>k) la fonction <math>f</math> est paire.</li> </ol> |
|--|--|
-

## Modes de raisonnement

### Exercice 5

Soit  $x$  et  $y$  deux réels. Montrer que  $\min(x, y) = \frac{x+y-|x-y|}{2}$ . et  $\max(x, y) = \frac{x+y+|x-y|}{2}$ .

---

### Exercice 6

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations ou inéquations suivantes.

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| a) $ 2x - 5  =  x^2 - 4 $ ;     | c) $\sqrt{ x - 3 } \leq x - 1$ ; |
| b) $\sqrt{ x - 3 } =  x - 1 $ ; | d) $\sqrt{x - 1} \geq x - 7$ .   |
- 

### Exercice 7

Soit  $x$  un réel tel que pour tout  $\varepsilon > 0$ ,  $|x| \leq \varepsilon$ . Montrer que  $x = 0$ .

---

### Exercice 8

Démontrer que  $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$  est un nombre irrationnel.

---

### Exercice 9

On veut montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini. Par l'absurde on suppose qu'il en existe qu'un nombre fini  $p_1, p_2, \dots, p_k$ . Conclure en considérant  $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_k + 1$ .

---

### Exercice 10

Déterminer toutes les applications  $f$  de  $\mathbb{N}$  vers  $\mathbb{R}$  telles que

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, \quad f(m + n) = f(m) + f(n).$$


---

### Exercice 11

Déterminer toutes les applications  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad f(x)f(y) = f(xy) + x + y.$$


---

## Raisonnement par récurrence

### Exercice 12

- a) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 0$  et pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$ . Montrer que pour tout  $n$  entier naturel,  $0 \leq u_n \leq 4$ .
- b) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 1$ ,  $u_1 = 2$  et pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ ,  $u_{n+2} := \frac{u_{n+1}^2}{u_n}$ . Montrer que la suite  $(u_n)$  est bien définie et déterminer une expression explicite de  $u_n$  pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$ .
- c) Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 0$ ,  $u_1 = 0$ ,  $u_2 = 2$  et pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$ ,  $u_{n+3} = 3u_{n+2} - 3u_{n+1} + u_n$ . Montrer que pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$ ,  $u_n = n(n - 1)$ .
-

**Exercice 13**

On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3, u_1 = 7$  et :

$$\forall n \geq 2, u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2}.$$

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^{n+1} + 3^n$ .

---

**Exercice 14**

Vérifier que pour tout entier naturel  $n \in \mathbb{N}$  :

$$\text{a) } \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}; \quad \left| \quad \text{b) } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \right| \quad \text{c) } \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$


---

**Exercice 15**

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$ .

---

**Exercice 16**

a) Soit  $f$  l'application définie par :  $\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = \frac{1}{x}$ .

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^*, f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$ .

b) Soit  $f(x) = \sin(x)$ . Vérifier que :  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^*, f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ .

---

**Exercice 17**

En utilisant un raisonnement par récurrence forte, montrer que pour tout  $n$  entier naturel non nul, il existe un unique couple  $(p, q)$  d'entiers naturels tels que  $n = 2^p(2q+1)$ .

---